

## 「ウィル・ステラ V ジェル」製造移管に伴う仕様変更案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、関東医薬品工場への製造移管に伴い、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

敬具

記

### 【対象品目】

42338:ウィル・ステラVジェル 60mL (以降、60mL で示します)

42330:ウィル・ステラVジェル 250mL P付 (以降、250mL で示します)

42331:ウィル・ステラVジェル 500mL 扁平P付 (以降、500mL 扁平 で示します)

42093:ウィル・ステラVジェル 600mL UDMD (以降、600mL で示します)

※仕様変更品の切替予定時期につきましては、別途、スケジュール一覧をご参照ください。



### 【変更内容】

- ① 60mL、250mL、500mL 扁平において、個箱包装からオーバershリンク包装に変更いたします。それに伴う、外装サイズの変更については変更内容③をご参照ください。

例) 250mL 包装イメージ

旧 (現行品)	新 (仕様変更品) 包装イメージ
	<p>実際はウィル・ステラV ジェルのデザインとなります。 製造開始前ですのでご了承ください。</p> 

## ② 保護シールのデザインを変更いたします（250mL、500mL 扁平）。

旧（現行品）	新（仕様変更品）
 <p><b>保護シール</b> 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。</p> <p><b>【ご注意】</b> シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p> <p>ここからはがす</p>	 <p><b>保護シール</b> 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。</p> <p>△ <b>注意</b> シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p> <p>下からはがす</p>

※仕様変更品の右下の「A」は弊社での部材の管理番号です。

## ③ 個箱および外装サイズを変更いたします。

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
60mL	外装：W406×D186×H125mm	外装：W251×D250×H119mm
250mL	外装：W274×D170×H169mm	外装：W258×D168×H164mm
500mL 扁平	外装：W293×D241×H195mm	外装：W268×D228×H188mm
600mL	個箱：W110×D70×H230mm 外装：W240×D230×H250mm	個箱：W113×D75×H230mm 外装：W241×D240×H245mm

④ ラベルのデザインを変更いたします。

60mL

旧（現行品）



新（仕様変更品）



250mL

旧（現行品）



手箱消毒用速乾性アルコールジェル  
ご使用に際して、この説明文章を必ずお読みください。

**第3類医薬品** **ml**  
（容量）

販売名 ウィルステアVジェル  
【使用上の注意】してはいいけないこと  
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
次の部位には使用しないこと (1) 顔面のある皮、(2) 目の周囲、粘膜等。  
相関すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 顔面の皮膚にアレルギー反応を起こしている人、(2) 薬などにアレルギー反応を起こしている人、2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
【効果又は効果】 手指の消毒  
【用法及び用量】 適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで磨り込む。清潔及び用量に留意する注意 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。 (3) 外用にのみ使用する。 (4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。【成分及び分量】 ウィルステアVジェルは、有効成分としてエタノール (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O) 76.9~81.4vol%、添加物としてグリセリン、疎水化ヒドロキシプロピルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、アラニール、香料を含有する。  
【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し保管すること。 (2) 小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと。 (原用の容器になつたり品質が変わる。) (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。 (5) 火気や引火性。 (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。 (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。 (8) スルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除くこと。  
【お問い合わせ先】 本剤に関するお問い合わせは、お問い合わせの窓口までご連絡ください。サラヤ株式会社 手箱部  
TEL.06-6796-3936  
受付時間：平日 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

ボトル：PE  
ポンプ：PP  
フィルム：PP  
製造番号：底面記載  
使用期限：底面記載  
MADE IN JAPAN A

新（仕様変更品）



ご使用に際して、この説明文章を必ずお読みください。

**第3類医薬品** **ml**  
（容量）

販売名 ウィルステアVジェル  
【使用上の注意】してはいいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと (1) 顔面のある皮、(2) 目の周囲、粘膜等。相関すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 顔面の皮膚にアレルギー反応を起こしている人、(2) 薬などにアレルギー反応を起こしている人、2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (顔面部位) 皮膚 (症状) 発赤・発赤・かゆみ (効果又は効果) 手指・皮膚の消毒  
【用法及び用量】 適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで磨り込む。清潔及び用量に留意する注意 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。 (3) 外用にのみ使用する。 (4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。【成分及び分量】 ウィルステアVジェルは、有効成分としてエタノール (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O) 76.9~81.4vol%、添加物としてグリセリン、疎水化ヒドロキシプロピルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、アラニール、香料を含有する。【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し保管すること。 (2) 小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと。 (原用の容器になつたり品質が変わる。) (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。 (5) 火気や引火性。 (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。 (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。 (8) スルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除くこと。 (9) 初期消火の場合、大量の水又は消火器で消火すること。  
【お問い合わせ先】 サラヤ株式会社 手箱部  
TEL.06-6796-3936  
受付時間：平日 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

情 商  
報 品  
の  
一  
詳  
し  
ら  
い

本剤は、リン酸でpHを酸性にしています。  
ボトル：PE、ポンプ：PP  
製造番号：底面記載  
使用期限：底面記載  
MADE IN JAPAN B



500mL 扁平

旧（現行品）



手指消毒用速乾性アルコールジェル

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

第3類医薬品

販売名 ウィルステラVジェル

【使用上の注意】**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の部位には**使用しないこと**（1）損傷のある皮膚。（2）目の周囲、粘膜等。

相関すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること（1）医師の治療を受けている人。（2）薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【関係部位】皮膚 【症状】発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒

【用法及び用量】適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む

＜用法及び用量に関する注意＞（1）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。（2）目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。（3）外用にのみ使用すること。（4）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。

【成分及び分量】ウィルステラVジェルは、有効成分としてエタノール（C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O）76.9～81.4vol%、添加物としてグリセリン、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）（4）取扱う場合、換気を十分行うこと。（5）火気近づけないこと。（6）使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。（7）本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。（8）ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。

【お問い合わせ先】本剤についてのお問い合わせは、お問い合わせ先のお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】サラヤ株式会社 学術部 TEL.06-4706-3938

【お問い合わせ先】受付時間：平日 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

【お問い合わせ先】副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

【お問い合わせ先】サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525

【お問い合わせ先】製造番号：底面記載

【お問い合わせ先】使用期限：底面記載

【お問い合わせ先】MADE IN JAPAN

【お問い合わせ先】ポトル：PE ポンプ：PP

【お問い合わせ先】フィルム：PP

【お問い合わせ先】製造番号：底面記載

【お問い合わせ先】使用期限：底面記載

【お問い合わせ先】MADE IN JAPAN

新（仕様変更品）



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

第3類医薬品

販売名 ウィルステラVジェル

【使用上の注意】**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の部位には**使用しないこと**（1）損傷のある皮膚。（2）目の周囲、粘膜等。

相関すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること（1）医師の治療を受けている人。（2）薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること（関係部位）皮膚（症状）発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒

【用法及び用量】適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む

＜用法及び用量に関する注意＞（1）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。（2）目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。（3）外用にのみ使用する。（4）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。

【成分及び分量】ウィルステラVジェルは、有効成分としてエタノール（C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O）76.9～81.4vol%、添加物としてグリセリン、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。（2）小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）（4）取扱う場合、換気を十分行うこと。（5）火気近づけないこと。（6）使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。（7）本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。（8）ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除く。（9）初期消火の場合、大量の水又は消火器で消火すること。

【お問い合わせ先】サラヤ株式会社 学術部 TEL.06-4706-3938

【お問い合わせ先】受付時間：平日 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

【お問い合わせ先】副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

【お問い合わせ先】サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525

【お問い合わせ先】製造番号：底面記載

【お問い合わせ先】使用期限：底面記載

【お問い合わせ先】MADE IN JAPAN

【お問い合わせ先】ポトル：PE ポンプ：PP

【お問い合わせ先】フィルム：PP

【お問い合わせ先】製造番号：底面記載

【お問い合わせ先】使用期限：底面記載

【お問い合わせ先】MADE IN JAPAN

※500mL 扁平のラベル仕様につきまして、印刷からタックラベルに変更いたします。

⑤ 個箱および外装のデザインを変更いたします。

<個箱>

	旧 (現行品)	新 (仕様変更品)
600 mL		

<外装>

	旧 (現行品)	新 (仕様変更品)
60 mL		

<p>250 mL</p>	<p>24箱×7段</p> <p>42330 250mL 10本</p>	<p>24箱×7段</p> <p>42330 250mL 10本</p>
<p>500 mL 扁平</p>	<p>16箱×5段</p> <p>42331 500mL 10本</p>	<p>16箱×5段</p> <p>42331 500mL 10本</p>
<p>600 mL</p>	<p>16箱×4段</p> <p>42093 600mL 6本</p>	<p>16箱×4段</p> <p>42093 600mL 6本</p>

以上