












# 外皮用殺菌消毒剤および関連製剤 用途一覧表

※ 製品添付文書より抜粋（一部改変）

製品販売名	組成	 手指・皮膚	 手術部位 (手術野)の皮膚	 手術部位 (手術野)の粘膜	 皮膚の 創傷部位	 粘膜の 創傷部位	 感染皮膚面	 腔洗浄	 結膜囊	 外陰・外性器	 医療機器 医療用具	 手術室・病室・ 家具・器具・物品	その他
サラヤ 消毒用エタノール (日局 消毒用エタノール)	15℃でエタノール(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O: 46.07)76.9～81.4vol%を含む(比重による)。	そのまま消毒部位に塗布。	そのまま消毒部位に塗布。	—	—	—	—	—	—	—	そのまま消毒部位に塗布。	—	—
70V/v%東豊消毒 アルコール (イソプロパノール)	1mL中 イソプロパノール700μL	イソプロパノールとして50～70%液を用いる。	—	—	—	—	—	—	—	—	イソプロパノールとして50～70%液を用いる。	—	—
消エタサラコール (エタノール)	エタノール(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O)76.9～81.4vol%を含有。添加物としてイソプロパノールを含有。	そのまま消毒部位に塗布。	そのまま消毒部位に塗布。	—	—	—	—	—	—	—	そのまま消毒部位に塗布。	—	—
サラヤ塩化ベンザ ルコニウム 10%液 (日局 ベンザルコニウム塩化物液)	日本薬局方ベンザルコニウム塩化物液で、ベンザルコニウム塩化物10W/v%を含有。	0.05～0.1%(100～200倍)溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭。	0.1%(100倍)溶液で約5分間洗い、その後0.2%(50倍)溶液を塗布。	0.01～0.025%(400～1,000倍)溶液を用いる。	0.01～0.025%(400～1,000倍)溶液を用いる。	0.01～0.025%(400～1,000倍)溶液を用いる。	0.01%(1,000倍)溶液を用いる。	0.02～0.05%(200～500倍)溶液を用いる。	0.01～0.05%(200～1,000倍)溶液を用いる。	—	0.1%(100倍)溶液に10分間浸漬か、2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、0.1%(100倍)溶液中で15分間煮沸。	0.05～0.2%(50～200倍)溶液を布片で塗布・清拭、又は噴霧。	—
5%グルコン酸 クロルヘキシジン液 「ヤクハン」 (クロルヘキシジン グルコン酸塩)	100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩 5g 添加物ラウロマクロゴール、赤色2号、香料	0.1～0.5%(10～50倍)水溶液を用いる。	0.1～0.5%(10～50倍)水溶液、又は0.5%(10倍)エタノール溶液を用いる。	—	0.05%(100倍)水溶液を用いる。	—	—	—	—	—	0.1～0.5%(10～50倍)水溶液、又は0.5%(10倍)エタノール溶液を用いる。	0.05%(100倍)水溶液を用いる。	—
ヤクラックス D 液 1% (次亜塩素酸ナトリウム)	次亜塩素酸ナトリウム製剤で、有効塩素(Cl) 1.00%を含む。	有効塩素濃度100～500ppm(20～100倍)溶液に浸すか、清拭。	有効塩素濃度50～100ppm(100～200倍)溶液で洗浄。	有効塩素濃度50～100ppm(100～200倍)溶液で洗浄。	—	—	—	—	—	—	有効塩素濃度200～500ppm(20～50倍)溶液に1分以上浸漬か、温溶液を用いて清拭。	有効塩素濃度200～500ppm(20～50倍)溶液を用いて清拭。	[排泄物] 有効塩素濃度1,000～10,000ppm(そのままと10倍)溶液を用いる。
ヤクゾール E 液 0.1 (ベンザルコニウム塩化物)	100mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物50 190mg(ベンザルコニウム塩化物として100mg) 添加物日局エタノール8.4mL(エタノールとして8vol%)	0.05～0.1%(原液～2倍)溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭。	0.1%(原液)溶液で、約5分間洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.2%溶液を塗布。	—	—	—	—	—	—	—	0.1%(原液)溶液に10分間浸漬か、2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、0.1%(原液)溶液中で15分間煮沸。	0.05～0.1%(原液～2倍)溶液を布片で塗布・清拭か、噴霧。	—
滅菌精製水 (日局 滅菌精製水)	イオン交換、超ろ過により精製した水を滅菌したもの。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	医療器具の洗浄に用いる。	—	—
ネグミン液 10% (ポビドンヨード)	1mL中 日本薬局方ポビドンヨード100mg(有効ヨウ素として10mg)含有 添加物ラウロマクロゴール、グリセリン、無水リン酸一水素ナトリウム、pH調節剤	—	そのまま消毒部位に塗布。	そのまま消毒部位に塗布。	そのまま患部に塗布。	そのまま患部に塗布。	そのまま患部に塗布。	—	—	—	—	—	—
サラヤ アルコール含浸綿 (製品販売名) 酒精綿G 酒精綿Gプラス	消毒液100mL中 日局エタノール83mL	そのまま手指・皮ふに塗布または塗擦する。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● 使用上の注意等詳細は、製品添付文書もしくはラベルをご参照ください。