

製造番号
使用期限

SARAYA

【効能又は効果】手指の消毒 第2類医薬品

【用法及び用量】適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3)外用にのみ使用すること。
- (4)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。

【成分及び分量】

ヒビスコールSは、100mL中に有効成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩を0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてアジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリルを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)取扱う場合、換気を十分行うこと。
- (5)火気に近づけないこと。
- (6)使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。
- (7)本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。

【お問い合わせ先】

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

サラヤ株式会社 お客様相談窓口

TEL. 06-6797-2525

受付時間：9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

第2類医薬品 速乾性手指消毒剤

ヒビスコールS

500mL 〈噴射ポンプ付〉

●効能又は効果 手指の消毒

●用法及び用量 適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。

●成分及び分量 ヒビスコールSは、100mL中に有効成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩を0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてアジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリルを含有する。

ご使用に際して、説明書を必ずお読みください。



引火性

火気厳禁

危険物第4類 アルコール類(エタノール)
水溶性・危険等級II

商品の
詳しい情報
はこちら



サラヤ株式会社
大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525

●販売名 ヒビスコールS 第2類医薬品

ヒビスコールSは、0.2%のクロルヘキシジングルコン酸塩を有効成分とする速乾性の手指消毒剤で、エタノール蒸発後も効果が持続します。本剤の使用による手荒れを軽減する成分として湿潤剤を配合しています。手指に噴射することにより、指先まで十分にヒビスコールSが行きわたり、簡単に手指消毒ができます。

●ご使用方法


- ①ボトルのキャップをはずし、専用噴射ポンプを図のように装着する。
- ②ポンプを押して適量を手指に吹きつける。
- ③付着した薬液を、指先までムラなく乾くまで擦り込む。

専用噴射ポンプの取付方法



減容容器

空容器を
つぶして廃棄
できます。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎0120-149-931



MADE IN JAPAN

c

ここを押して
あける

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品 速乾性手指消毒剤

ヒビスコールS

クロルヘキシジングルコン酸塩を有効成分とする速乾性の手指消毒剤で、エタノール蒸発後も効果が持続します。本剤は手荒れを防止する成分として湿潤剤を配合しています。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1)損傷のある皮ふ。(2)目の周囲、粘膜等。

🗉 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。