

日本薬局方
外皮用殺菌消毒剤

消毒用エタノール

サラヤ消毒用エタノール



**使用後 両手で簡単に
折りたためる
ゴミ75%削減 減容ボトル**

このボトルは、使い切った後、手で簡単に折りたたむことができ、ゴミの減容化に役立ちます。



- ① ボトルの真ん中を両手で持ちつぶす。
- ② しっかりと押し込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ廃棄する。

サラヤ消毒用エタノール 500mL			
容 量	500mL	1 梱入数	20
JANコード	49-87696-44105-7		

商品名 和名	サラヤ消毒用エタノール	販売開始年月	2004年6月	日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21600AMZ00232000	製造発売元	サラヤ株式会社	薬価収載年月	2004年5月
【 禁 忌 (次の部位には使用しないこと) 】 損傷皮膚 及び 粘膜 (刺激作用を有するので)					
組成・性状	本品は15℃でエタノール (C ₂ H ₆ O : 46.07) 76.9~81.4vol%を含む (比重による)。本品は無色澄明の液で、特異なにおい及びやくような味がある。本品は水と混和する。本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。本品は揮発性である。				
効能・効果	手指・皮膚の消毒、手術部位 (手術野) の皮膚の消毒、医療用具の消毒。				
用法・用量	本品をそのまま消毒部位に塗布する。				
使用上の注意	1. 重要な基本的注意 (1) 本品が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。(2) 広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[エタノール蒸気に大量にまたは繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。] 2. 副作用 本品は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 3. 適用上の注意 投与経路：外用にのみ使用すること。使用時：(1) 同一部位 (皮膚面) に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。(2) 血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。(3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。(4) 本品は引火性、爆発性があるため、火気 (電気メス使用等も含む) には十分注意すること。また、電気メスによる発火事故が報告されているので、電気メス等を使用する場合には、本品を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。 4. その他の注意 承認外の経皮的エタノール注入療法 (PEIT) 使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本品の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。				
	薬効薬理	本品は、使用濃度において栄養型細菌 (グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞 (炭疽菌、破傷風菌等) 及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。			
包装	500mL				

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。(2004年5月作成)

SARAYA

代表 TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

取扱店

サラヤ株式会社 サラヤ消毒用エタノールチラシ



46-0459-00-4PDF