



手指消毒用速乾性アルコールジェル ヒビスコールSジェル1

〈第2類医薬品〉

クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2W/v% 配合
エタノール83vol%含有(溶剤として)



各種ホルダー類も
あります。
詳しくは営業担当
にお問い合わせせ
ください。

60mL

250mLポンプ付

500mL扁平ポンプ付



500mL角ポンプ付



商品特徴

1. 手肌をやさしくいたわりながらしっかり消毒

保湿成分としてグリセリン、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、
プロピレングリコールを配合し、手荒れに配慮しています。

2. 殺菌効果が持続します


使用後も、有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩により、殺菌効果が持続します。

3. さらっとした使用感でべたつきません

手荒れは、医療従事者の悩みです。

手荒れに関する意識調査

- アンケート対象者総数：3,730人
- ひどく手が荒れている： 322人
 - 少し手が荒れている： 2,004人
 - 特に手荒れはない： 1,390人
 - 回答無し： 14人



サラヤ株式会社 学術部調べ


ヒビスコールSジェル1の水分保持効果

角層水分保持能

<結果>

ヒビスコールSジェル1を連続塗布すると、何も塗布していないコントロールよりも角層水分保持能が有意に($P<0.01$)増加しました。また、ヒビスコールSジェル1と当社従来品との間でも有意差($P<0.05$)が認められました。

ヒビスコールSジェル1は当社従来品と比較して高い角層水分保持能を示しており、保湿効果に優れていることが確認されました。



Drug Information 2017年10月改訂 第5版 添付文書より作成

販売名	ヒビスコールSジェル1	薬効分類番号	2619	製造販売元	サラヤ株式会社								
使用上の注意	<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 次の部位には使用しないこと (1) 損傷のある皮ふ。 (2) 目の周囲、粘膜等。 <p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮 膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ショック (アナフィラキシー)</td> <td>使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</td> </tr> </tbody> </table>					関係部位	症状	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	症状の名称	症 状	ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
関係部位	症状												
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ												
症状の名称	症 状												
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。												
効能又は効果	手指の消毒												
用法及び用量	適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。												
用法及び用量に関連する注意	<ol style="list-style-type: none"> 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。 外用にのみ使用すること。 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。 												
成分及び分量	ヒビスコールSジェル1は、100mL中に有効成分として クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてグリセリン、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂脂肪酸グリセリル、ヒプロメロースおよびプロピレングリコールを含有する。												
保管及び取り扱い上の注意	<ol style="list-style-type: none"> 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。 小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。) 取扱う場合、換気を十分行うこと。 火気に近づけないこと。 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。 ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。 初期消火の場合、大量の水又は消火器で消火すること。 												
包装	60mL, 250mL, 500mL												

本製品は一般用医薬品(第2類医薬品)です。 ● ご使用の際は、ラベルに記載の説明文書をよくお読みください。

品名	内容量/規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ヒビスコールSジェル1	60mL	48	42136	49-87696-42136-3
	250mLポンプ付	10	42132	49-87696-42132-5
	500mL扁平ポンプ付	10	42133	49-87696-42133-2
	500mL角ポンプ付	10	42134	49-87696-42134-9

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2025年4月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)