




商品名	和名	ヒビスコール液A0.5%		承認番号	22200AMX00906000	日本標準商品分類番号	872619									
	洋名	HibiscoholA0.5%		薬価基準	対象外	承認年月日	2010年8月11日									
貯法		1. 気密容器に入れて遮光保存。2. 火気を避けて保存。		使用期限	紙箱、容器等に記載	製造販売元	サラヤ株式会社									
2.禁忌		(次の患者には投与しないこと) 2.1 クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者 2.2 膈、膀胱、口腔等の粘膜面には使用しないこと〔クロルヘキシジン製剤の左記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。〕 2.3 損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと〔刺激作用を有する。〕		14.適用上の注意	14.2.6 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。 14.3 薬剤使用後の注意 本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。											
3.組成・性状		3.1 組成 <table><tr><td>有効成分</td><td>100mL中クロルヘキシジングルコン酸塩0.5gを含有する。</td></tr><tr><td>添加剤</td><td>アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、グリセリン、pH調整剤、エタノールを含有する。</td></tr></table> 3.2 製剤の性状 <table><tr><td>性状</td><td>無色～微黄色透明な液で特異なにおいがある。</td></tr></table>		有効成分	100mL中クロルヘキシジングルコン酸塩0.5gを含有する。	添加剤	アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、グリセリン、pH調整剤、エタノールを含有する。	性状	無色～微黄色透明な液で特異なにおいがある。	15.その他の注意	15.1 臨床使用に基づく情報 クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の使用によりショック症状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある ¹⁾ 。					
有効成分	100mL中クロルヘキシジングルコン酸塩0.5gを含有する。															
添加剤	アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、グリセリン、pH調整剤、エタノールを含有する。															
性状	無色～微黄色透明な液で特異なにおいがある。															
4.効能・効果		手指・皮膚の消毒		18.薬効薬理	18.1 作用機序 低濃度では細菌の細胞膜に障害を与え、細胞質成分の不可逆的漏出や酵素阻害を起こし、抗菌作用(殺菌作用)を示す。高濃度では細胞内のタンパク質や核酸の沈着を起こすことにより、抗菌作用を示す ²⁾ 。 18.2 殺菌作用 18.2.1 広範囲の微生物に作用するが、特にグラム陽性菌には低濃度でも有効である。グラム陰性菌にも比較的低濃度で殺菌作用を示すが、グラム陽性菌に比べて抗菌力に幅がある。グラム陰性菌のうち、Alcaligenes、Pseudomonas、Achromobacter、Flavobacterium属などにはまれに抵抗菌株もある。芽胞形成菌の芽胞には無効である。結核菌に対し水溶液では静菌作用、アルコール溶液では迅速な殺菌作用がある。真菌類の多くに対し抗菌力を示すが細菌類より弱い。ウイルスに対する効力は確定していない ²⁾ 。 18.2.2 殺菌力試験 ヒビスコール液A0.5%は、in vitroの試験において、グラム陽性菌、グラム陰性菌および真菌を15秒以内に殺菌した ³⁾ 。											
6.用法・用量		本剤をそのまま用いる。														
8.重要な基本的注意		ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。														
9.特定の背景を有する患者に関する注意		9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1 薬物過敏症の既往歴のある者(クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者を除く) 9.1.2 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者		19.有効成分に関する理化学的知見	一般的名称:クロルヘキシジングルコン酸塩(Chlorhexidine Gluconate) 化学名:1,1'-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)biguanide], di-D-gluconate 分子式:C ₂₂ H ₃₀ Cl ₂ N ₁₀ ・2C ₆ H ₁₂ O ₇ 分子量:897.76 化学構造式:  性状:通常、水溶液として存在し、その20W/V%液は、無色～微黄色の澄明な液体で、においはなく、味は苦い。水又は酢酸(100)と混和する。20W/V%液1mLはエタノール(99.5)5mL以下又はアセトン3mL以下と混和するが、溶媒の量を増加するとき白濁する。光によって徐々に着色する。 比重d ₂₀ ⁴ :1.06～1.07											
11.副作用		次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック(0.1%未満)、アナフィラキシー(頻度不明) 血圧低下、じん麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。 11.2 その他の副作用 <table><tr><td></td><td>0.1%未満</td><td>頻度不明</td></tr><tr><td>過敏症</td><td>発疹、じん麻疹</td><td></td></tr><tr><td>皮膚</td><td></td><td>刺激症状</td></tr></table>				0.1%未満	頻度不明	過敏症	発疹、じん麻疹		皮膚		刺激症状			
	0.1%未満	頻度不明														
過敏症	発疹、じん麻疹															
皮膚		刺激症状														
14.適用上の注意 (右につづく)		14.1 薬剤使用前の注意 14.1.1 血清・膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。 14.1.2 石鹸類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石鹸分を十分に洗い落としてから使用すること。 14.2 薬剤使用時の注意 14.2.1 手指消毒以外の目的には使用しないこと。 14.2.2 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。 14.2.3 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。 14.2.4 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。 14.2.5 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。		20.取扱い上の注意 火気を避けて保存すること。												
				22.包装 500mL、600mL、1L(全てポリエチレン容器)												
				23.主要文献 1)大利隆行 他:アレルギー。1984;33(9):707 2)第十八改正日本薬局方解説書、廣川書店。2021:C-1877-C-1881 3)サラヤ株式会社パイオケミカル研究所 資料												

■ ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	調剤包装単位コード
				販売包装単位コード (*****：有効期限 %%%%)：製造番号)
ヒビスコール液A0.5%	500mL角ポンプ付	10	42341	(01)04987696100251
				(01)14987696423418 (17)***** (10)%%%)
	1Lポンプ付	10	42342	(01)04987696100268
				(01)14987696423425 (17)***** (10)%%%)
	1Lポンプ付 TUD用	10	41773	(01)04987696100459
				(01)14987696417738 (17)***** (10)%%%)
	600mLディスペンサー用	6	41948	(01)04987696100091
				(01)14987696419480 (17)***** (10)%%%)

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2026年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)

SARAYA

ラビング法による手術時手指消毒に



〈外用薬〉

速乾性 手指消毒剤 ヒビスコール液A0.5%

○短時間で消毒 ○持続的な殺菌効果 ○手荒れに配慮



有効成分
クロルヘキシジン
グルコン酸塩
0.5% 配合

医療現場における手指衛生のためのCDCガイドライン [2002年発行]

● 外科的技を行うにあたっては、滅菌手袋着用の前に抗菌石鹸が特続活性のあるアルコールベースの手指消毒薬で、手術時手指消毒を行うことが推奨される。【カテゴリーIB】

手術医療の実践ガイドライン(改訂第四版) [2026年3月発行]

● C.手術時手洗い 1.方法 揉み洗い法またはラビング法のいずれかを行う。

(解説)その方法は主に3つある。(1) 4w/V%クロルヘキシジングルコン酸塩スクラブ剤もしくは7.5w/V%ボビドンヨードスクラブ剤を使用して、用手的に肘まで洗う「揉み洗い法」

(2) クロルヘキシジングルコン酸塩等を含有する擦式消毒用アルコール製剤を肘まで塗り込む「ラビング法」

(3) 「揉み洗い法」を実施したのち、スクラブ剤を水で洗い流し拭き取った後、アルコール性手指消毒薬などで手(と手首)を消毒する「Two-stage法」
いずれの方法でも、各製剤の添付文書に沿った使用方法を採る限り、手指および前腕の細菌数の減少効果に差はない。

ヒビスコール液A0.5%

製品特徴

ヒビスコール液A0.5%は、手術時手指消毒剤に求められる殺菌効果と持続活性を備えた、速乾性手指消毒剤です。

① ラビング法による手術時手指消毒に最適

ヒビスコール液A0.5%を用いたラビング法による手術時手指消毒は、従来の抗菌性スクラブ製剤を用いた手術時手洗い方法と比べて、短時間で同等以上の殺菌効果が得られます。また、皮膚に対する影響も少なく、費用の節減効果も期待されます。

② 手術時手指消毒における消毒効果

欧州標準化委員会（CEN）の消毒剤の効力評価基準のうち、手術時手指消毒剤の評価基準であるEN12791（ヒトを対象とした*in vivo*試験）を参考にした方法で、EN12791の要求事項を満たしています。

③ 幅広い殺菌作用

グラム陽性菌、グラム陰性菌、真菌等に対し、広範囲の抗微生物スペクトルを有します。

④ 持続的な殺菌効果

ヒビスコール液A0.5%は、クロルヘキシジングルコン酸塩0.5%を有効成分とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指消毒剤です。クロルヘキシジングルコン酸塩により、手指消毒剤乾燥後も殺菌効果が持続します。

⑤ 良好な使用感

皮膚にすっとなじむローションタイプです。使用後もべたつきません。

⑥ 手荒れに配慮

湿潤剤としてアジピン酸ジイソブチル、アラントイン、グリセリンを配合し、手荒れに配慮しています。

⑦ 副作用


重大な副作用としてショック、アナフィラキシーがあらわれることがあります。また、発疹・蕁麻疹等の過敏症や皮膚刺激症状があらわれることがあります。



持続効果

5時間後も持続効果を有します。

ヒビスコール液A0.5%の細菌に対する殺菌力の持続効果を調べた結果、5時間後も持続効果を有していることが確認されました。



＜供試菌＞ *Enterococcus hirae* ATCC10541（エンテロコッカス ヒラエ）
＜方法＞ 被験者の前腕部をカリ石けん液約3mLで30秒間洗い、水道水で30秒間すすいだ後、余分な水分をペーパータオルで除去しました。前腕内側部（2×2cm）に、各種試験薬剤100μLを塗布し、塗布直後、1時間後、3時間後および5時間後に供試菌液（10⁸～10⁹CFU/mL）20μLを塗布しました。菌液塗布3分後に、滅菌綿棒で拭き取って菌を回収し、菌数を測定しました。薬剤無塗布部位についても同様に操作してコントロールとし、対数減少値を算出しました。


参考文献：社内資料

図1 各種薬剤の *Enterococcus hirae* ATCC10541 に対する持続効果（n=5）

殺菌効果

EN12791の要求事項を満たしています。

ヒビスコール液A0.5%による手術時手指消毒の効果を、欧州標準化委員会（CEN）が定める欧州規格EN12791を用いて評価した結果、手術時手指消毒剤として十分な効果があることを確認しました。



＜方法＞ カリ石けん液で1分間の予備洗浄を行いました（ブラシは使用しない）。乾燥直後、トリプトソーヤブイヨン培地が入ったペトリディッシュの底に1分間、指（親指も含む）を擦りつけて、常在菌を回収しました（コントロール）。その後、ヒビスコール液A0.5%を用いて3mL×3回（1回目；右手指先と右前腕、2回目；左手指先と左前腕、3回目；両手指）の消毒、あるいは対照液を用いて両手指3分間の消毒を行いました。消毒後、コントロールの方法と同様に片方の手の常在菌を回収しました。もう片方の手に手術用手袋を装着し、3時間外部からの汚染を遮断しました。3時間後、手袋を取り、同様に常在菌を回収しました。

参考文献：社内資料

図2 ヒビスコール液 A0.5% の EN12791 に基づく殺菌力試験結果（n=18）

ノータッチ式ディスペンサー

HUD-1-M



商品コード：42530

ノータッチ式のため衛生的。

コンパクトで限られたスペースにも設置可能。

●最大6回連続吐出

手をかざすと最大6回まで連続吐出可能。手を離せば即座に停止し、かざすと連続吐出が再開します。

●多彩な使用液に対応

サラヤの多彩なラインアップから用途に応じて、最適な使用液を自由に選択可能です。

●吐出量の調整が可能

簡単なパーツ調整だけで、1回あたりの吐出量を現場ニーズに合わせて0.8mL～1.8mLで調整可能。無駄使いを防ぎ、消耗品のコスト削減に貢献します。

●超コンパクト&2WAY設置

壁掛け・スタンド設置のどちらにも対応。限られたスペースでも作業の邪魔にならないコンパクトサイズであらゆる場所に設置可能です。