

日本薬局方 第3類医薬品

# ベンザルコニウム塩化物液

(販売名)ベンザルコニウム塩化物10%液(サラヤ)

〈殺菌消毒剤〉

(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(5)皮革製品に付着した場合は、変質させることがあるので注意すること。(6)染色した布地は退色することがあるので注意すること。

### 【お問い合わせ先】

サラヤ株式会社 お客様相談窓口  
TEL.06-6797-2525  
受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

## ゴミ75%削減 減容ボトル

- 1 ボトルの真ん中を両手で持ちつづす。
- 2 しっかりと押さえ込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ、廃棄する。



製造番号：底面記載  
使用期限：底面記載  
MADE IN JAPAN



ボトル：PE  
キャップ：PP  
ラベル：PE

日本薬局方 第3類医薬品

# ベンザルコニウム塩化物液

(販売名)ベンザルコニウム塩化物10%液(サラヤ)

〈殺菌消毒剤〉

500mL

(記載要領変更に伴う改訂)

手指や創傷面の殺菌・消毒にお使いください。

### 性状

本剤は無色～淡黄色澄明の液で、特異なおいがある。本剤は振ると強く泡立つ。

このボトルは、使用后、両手で簡単に折りたたむことができ、ゴミの減量化に役立ちます。

サラヤ株式会社  
大阪市東住吉区湯屋 2-2-8

日本薬局方 第3類医薬品

# ベンザルコニウム塩化物液

(販売名)ベンザルコニウム塩化物10%液(サラヤ)

〈殺菌消毒剤〉

ご使用に際して、このラベルの説明をよくお読みください。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 患部が広範囲の人。
  - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

日本薬局方 第3類医薬品

# ベンザルコニウム塩化物液

(販売名)ベンザルコニウム塩化物10%液(サラヤ)

〈殺菌消毒剤〉

**【効能・効果】**手指の殺菌消毒、創傷面の殺菌消毒  
**【用法・用量】**1.手指の殺菌消毒 本剤を水で100~200倍にうすめた液で洗う。2.創傷面の殺菌消毒 本剤を水で400~1,000倍にうすめた液で患部を洗うか、脱脂綿又はガーゼに浸して患部に軽く塗る。〈用法・用量に関連する注意〉(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないよう、注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用すること。(4)定められた用法・用量を守ること。(5)原液のまま使用しないこと。(6)原液又は濃厚液が皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水で洗い流すこと。(7)ガーゼ、脱脂綿などに浸して傷口に貼り付けないこと。(8)石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、よく洗い流してから使用すること。

### 【成分・分量】

ベンザルコニウム塩化物10%w/v

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。

