

「70v/v%東豊消毒アルコール」販売名変更および GS1 可変情報表示に伴う表示変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、医療事故防止等のため、販売名を変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。また、平成 28 年 8 月 30 日付通知「医療用医薬品のバーコード表示の実施要項」の一部改正（医政経・薬生安・薬生監麻発 0830 第 1 号）に伴い、下記の通り、表示変更を行いますので、ご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、薬液処方の変更はございません。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒お願い申し上げます。
敬具

記

【出荷予定時期】

2020 年 12 月以降、現行品在庫が無くなり次第の出荷とさせていただきます。

【変更内容】

	旧(現行品)	新(仕様変更品)
販売名	70v/v%東豊消毒アルコール	イソプロパノール消毒液 70%「東豊」
コンピュータ登録商品名	イソプロパノール70%500mL	イソプロパノール70%500mL20
承認番号	21100AMZ00141000	30200AMX00036000
商品 CD	44123	44122
調剤包装単位	0-49-87696-10032-9	0-49-87696-10034-3
販売包装単位	1-49-87696-44120-7	1-49-87696-44122-1
元梱包装単位	2-49-87696-44120-4	2-49-87696-44122-8
統一コード	696441200	696441224

※包装サイズ、入数、価格等の変更はございません。

- ① 販売名変更に伴い、ラベルデザインを変更いたします。
製造番号および使用期限につきまして、底面記載から側面記載に変更いたします(赤点線枠部分)。
また、販売包装単位につきまして、使用期限および製造番号の可変情報を含んだコードに変更いたします。
販売包装単位の可変情報は都度、バーコードラベルに印字し、容器に貼付いたします(青点線枠部分)。

旧(現行品)

70%イソプロパノール
400ml
70%東豊消毒アルコール
〈外皮用殺菌消毒剤〉

ゴミ75%削減 減容ボトル
使用後 手で簡単に折りたたみ
ゴミの減容化にお役立てください。

①ボトルの真ん中を両手で持ち、つぶす。
②しっかりと押し込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ、廃棄する。



製造番号: 製造記録
使用期限: 製造記録

材質: ボトル: PE
キャップ: PP
ラベル: PE

70%イソプロパノール
400ml
70%東豊消毒アルコール
〈外皮用殺菌消毒剤〉

2008年8月第3版改訂(新コード付記)
1999年7月第2版改訂(薬種収載)
(日本標準品部分番号) 872615
JANコード 21100AMZ00141000
薬品収載 1995,7
製法規格 1996,3
再評価結果 1993,4

用法: 気密容器
使用期限: 製造の年月日から3年
注意: 取扱い上の注意事項

500mL

火気厳禁

危険物第4類
アルコール類
水溶性・危険等級II

発売元
サラヤ株式会社
大阪府東住吉区東津守2-2-8
TEL.06-6797-2525

製造販売元
東豊薬品株式会社
T124-0025 東京都葛飾区西新小倉4-15-1

【禁忌】
(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜(刺激作用を有するので)

【組成・性状】
組成: 1mL中 イソプロパノール 700μL
性状: 本品は無色透明の液で、特異な臭いを有する。

【効果・効能】
手洗・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】
通常、イソプロパノールとして、50~70%液を用いる。

【使用上の注意】
(1) 重要な基本的注意
本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用する。

(2) 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用:

過敏症	発疹等
皮膚	過敏症状

注: このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(3) 臨床検査結果に及ぼす影響
注射部位に発赤をおこすことがあるので、アレルギー

70%イソプロパノール
400ml
70%東豊消毒アルコール
〈外皮用殺菌消毒剤〉

組成・性状
組成: 1mL中 イソプロパノール 700μL
性状: 本品は無色透明の液で、特異な臭いを有する。

効果・効能
手洗・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量
通常、イソプロパノールとして、50~70%液を用いる。

使用上の注意
(1) 重要な基本的注意
本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用する。

(2) 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用:

過敏症	発疹等
皮膚	過敏症状

注: このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(3) 臨床検査結果に及ぼす影響
注射部位に発赤をおこすことがあるので、アレルギー

テストの判断を妨害することがある。
(4) 適用上の注意
人体
ア、外用にのみ使用すること。イ、服に入らないように注意すること。ウ、広範囲又は長期回使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。エ、同一部位に反復使用した場合には、剥離等による皮膚荒れを起すことがあるので注意すること。

【取扱い上の注意】
注意
火気厳禁 危険等級II、アルコール類、水溶性

MADE IN JAPAN

新(仕様変更品)

70%イソプロパノール
400ml
イソプロパノール消毒液70%「東豊」
〈外皮用殺菌消毒剤〉

ゴミ75%削減 減容ボトル
使用後 手で簡単に折りたたみ
ゴミの減容化にお役立てください。

①ボトルの真ん中を両手で持ち、つぶす。
②しっかりと押し込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ、廃棄する。



製造番号: 製造記録
使用期限: 製造記録

材質: ボトル: PE
キャップ: PP
ラベル: PE

70%イソプロパノール
400ml
イソプロパノール消毒液70%「東豊」
〈外皮用殺菌消毒剤〉

2020年6月作成(第1版)
(日本標準品部分番号) 872615
JANコード 30200AMX00036000
薬品収載 POP05
製法規格 POP09
再評価結果 1993,4

用法: 気密容器、火気厳禁を厳守
使用期限: 製造の年月日から3年
注意: 取扱い上の注意事項

500mL

火気厳禁

危険物第4類
アルコール類
水溶性・危険等級II

発売元
サラヤ株式会社
大阪府東住吉区東津守2-2-8
TEL.06-6797-2525

製造販売元
東豊薬品株式会社
T124-0025 東京都葛飾区西新小倉4-15-1

【禁忌】
(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜(刺激作用を有するので)

【組成・性状】
組成: 1mL中 イソプロパノール 700μL
性状: 本剤は無色透明の液で、特異な臭いを有する。

【効果・効能】
手洗・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】
通常イソプロパノールとして、50~70%液を用いる。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用する。

2. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用:

過敏症	発疹等
皮膚	過敏症状

注: このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響
注射部位に発赤をおこすことがあるので、アレルギー

70%イソプロパノール
400ml
イソプロパノール消毒液70%「東豊」
〈外皮用殺菌消毒剤〉

組成・性状
組成: 1mL中 イソプロパノール 700μL
性状: 本剤は無色透明の液で、特異な臭いを有する。

効果・効能
手洗・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量
通常イソプロパノールとして、50~70%液を用いる。

使用上の注意
1. 重要な基本的注意
本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用する。

2. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用:

過敏症	発疹等
皮膚	過敏症状

注: このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響
注射部位に発赤をおこすことがあるので、アレルギー

テストの判断を妨害することがある。
4. 適用上の注意
(1) 人体
1) 外用にのみ使用すること。2) 服に入らないように注意すること。3) 広範囲又は長期回使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。4) 同一部位に反復使用した場合には、剥離等による皮膚荒れを起すことがあるので注意すること。

【取扱い上の注意】
注意
火気厳禁 危険等級II、アルコール類、水溶性

MADE IN JAPAN

青点線枠部分には右イメージの
バーコードラベルを貼付いたします。



