


# 外皮用殺菌消毒剤および関連製剤 用途一覧表

※ 製品添付文書より抜粋（一部改変）

製品販売名	組成	 手指・皮膚	 手術部位 (手術野)の皮膚	 手術部位 (手術野)の粘膜	 皮膚の 創傷部位	 粘膜の 創傷部位	 感染皮膚面	 腔洗浄	 結膜囊	 医療機器 医療用具	 手術室・病室・ 家具・器具・物品	その他
クロルヘキシジン グルコン酸塩 エタノール消毒薬 1% 「サラヤ」 	100mL中 クロルヘキシジン グルコン酸塩 1gを含有。 添加物としてエタノール、 グルコン酸を含有。	洗浄後、1日数回 適量を塗布する。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サラヤ 消毒用エタノール (日局 消毒用エタノール) 	15℃でエタノール(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O: 46.07)76.9～81.4vol% を含む(比重による)。	そのまま消毒部位 に塗布する。	そのまま消毒部位 に塗布する。	—	—	—	—	—	—	そのまま消毒部位 に塗布する。	—	—
消エタサラコール (エタノール) 	エタノール(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O)76.9 ～81.4vol%を含有。 添加物としてイソプロパノール を含有。	そのまま消毒部位 に塗布する。	そのまま消毒部位 に塗布する。	—	—	—	—	—	—	そのまま消毒部位 に塗布する。	—	—
70V/v%東豊消毒 アルコール (イソプロパノール) 	1mL中 イソプロパノール 700μLを含有。	イソプロパノールと して50～70%液 を用いる。	—	—	—	—	—	—	—	イソプロパノールと して50～70%液 を用いる。	—	—
サラヤ塩化ベンザ ルコニウム 10%液 (日局 ベンザルコニウム塩化物液) 	日本薬局方ベンザルコニウム 塩化物液で、ベンザルコ ニウム塩化物 10W/v%を 含有。	0.05～0.1%(100 ～200倍)溶液に 浸して洗い、滅菌ガ ーゼあるいは布片で 清拭する。	0.1%(100倍)溶液 で約5分間洗い、 その後0.2%(50 倍)溶液を塗布する。	0.01～0.025% (400～1,000倍) 溶液を用いる。	0.01～0.025% (400～1,000倍) 溶液を用いる。	0.01～0.025% (400～1,000倍) 溶液を用いる。	0.01%(1,000倍) 溶液を用いる。	0.02～0.05% (200～500倍) 溶液を用いる。	0.01～0.05% (200～1,000倍) 溶液を用いる。	0.1%(100倍)溶液 に10分間浸漬か、 2%炭酸ナトリウム 水溶液で洗い、0.1% (100倍)溶液中で 15分間煮沸する。	0.05～0.2%(50 ～200倍)溶液を 布片で塗布・清拭、 又は噴霧する。	—
ヤクゾールE液 0.1 (ベンザルコニウム塩化物) 	100mL中 ベンザルコニウム 塩化物として0.1gを含有。 添加物として、エタノール 8vol%を含有。	0.05～0.1%(原液 ～2倍)溶液に浸し て洗い、滅菌ガ ーゼあるいは布片で 清拭する。	0.1%(原液)溶液 で、約5分間洗い、 その後ベンザルコ ニウム塩化物0.2% 溶液を塗布する。	—	—	—	—	—	—	0.1%(原液)溶液 に10分間浸漬か、 2%炭酸ナトリウム 水溶液で洗い、 0.1%(原液)溶液 中で15分間煮沸する。	0.05～0.1%(原液 ～2倍)溶液を布片 で塗布・清拭、又は 噴霧する。	—
ヤクラックスD液 1% (次亜塩素酸ナトリウム) 	次亜塩素酸ナトリウム製剤 で、有効塩素(Cl)1.00%を 含有。	有効塩素濃度100 ～500ppm(20 ～100倍)溶液に 浸すか、清拭する。	有効塩素濃度50 ～100ppm(100 ～200倍)溶液で 洗浄する。	有効塩素濃度50 ～100ppm(100 ～200倍)溶液で 洗浄する。	—	—	—	—	—	有効塩素濃度200 ～500ppm(20 ～50倍)溶液に1分 以上浸漬か、温溶 液を用いて清拭する。	有効塩素濃度200 ～500ppm(20 ～50倍)溶液を用い て清拭する。	(排泄物) 有効塩素濃度1,000～10,000ppm (そのまま～10倍)溶液を用いる。  (HBウイルスの消毒) ・血液その他の検体物質に汚染され た器具の場合は、有効塩素濃度 10,000ppm(そのまま)溶液を用いる。 ・汚染がはっきりしないものの場合 は、有効塩素濃度1,000～5,000 ppm(2～10倍)溶液を用いる。
滅菌精製水 (日局 滅菌精製水) 	本品 1mL中に日局滅菌精 製水 1mL含有。	—	—	—	—	—	—	—	—	医療器具の洗浄に 用いる。	—	溶解剤として、無菌を条件とする 製剤の調製に用いる。
サラヤ アルコール含浸綿 	消毒液 100mL中 日局エタノール83mL 含有。	そのまま消毒部位 に塗布または塗擦 する。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サラヤ アルコール 含浸綿E 	消毒液 100mL中 日局エタノール83mL 含有。	そのまま消毒部位 に塗布または塗擦 する。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● 使用上の注意等詳細は、製品添付文書もしくはラベルをご参照ください。